

# BAJAJAZ

## CIUDAD DE LAS AVES



Ayuntamiento de Badajoz  
Concejalía de Turismo



### ZONAS DE AVISTAMIENTOS DE AVES

**1** Puente de la Autonomía, confluencia del Rivillas, Guadiana y canal de los Ayala.

**2** Puente de Palmas: pasarela sobre el río.

**3** Paseo Fluvial (mirador del Calamón y garcilla cangrejera).

**4** Puente Real: nueva pasarela sobre el río.

**5** Azud margen izquierda (colonias de garzas).

**6** Azud margen derecha (vista de aves entrando al dormitorio).

**R** \_\_\_ Residente todo el año

**E** \_\_\_ Estival, especie reproductora presente durante la primavera y el verano

**2**

#### (Puente de Palmas)

Ánade azulón (*Anas platyrhynchos*) R  
Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*) E  
Avetorillo común (*Ixobrychus minutus*) R  
Martinete común (*Nycticorax nycticorax*) R  
Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*) R  
Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*) R  
Garceta común (*Egretta garzetta*) R  
Garceta grande (*Egretta alba*) I  
Garza real (*Ardea cinerea*) R  
Garza imperial (*Ardea purpurea*) E  
Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) E  
Morito común (*Plegadis falcinellus*) R  
Espátula común (*Platalea leucorodia*) R  
Milano negro (*Milvus migrans*) E  
Milano real (*Milvus milvus*) I  
Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*) R  
Cernícalo primilla (*Falco naumanni*) V  
Rascón europeo (*Rallus aquaticus*) R  
Gallineta común (*Gallinula chloropus*) R  
Calamón común (*Porphyrio porphyrio*) R

Chorlito chico (*Charadrius dubius*) R  
Agachadiza común (*Gallinago gallinago*) I  
Andarrios chico (*Actitis hypoleucos*) I  
Andarrios grande (*Tringa ochropus*) I  
Gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*) R  
Gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*) I \*muy rara  
Gaviota de Delaware (*Larus delawarensis*) I \*muy rara  
Gaviota cana (*Larus canus*) I \*muy rara  
Gaviota sombría (*Larus fuscus*) R  
Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*) I \*muy rara  
Gaviota enana (*Hydrocoloeus minutus*) I \*muy rara  
Charrancito común (*Sternula albifrons*) E  
Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybrida*) E  
Fumarel común (*Chlidonias niger*) E  
Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*) R  
Vencejo común (*Apus apus*) E  
Vencejo pálido (*Apus pallidus*) E  
Vencejo real (*Apus melba*) E  
Martín pescador común (*Alcedo atthis*) R  
Golondrina común (*Hirundo rustica*) E  
Golondrina dáurica (*Cecropis daurica*) E  
Avión común (*Delichon urbicum*) E

Lavandera blanca (*Motacilla alba*) I  
Petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*) I  
Ruiñeñor común (*Luscinia megarhynchos*) E  
Ruiñeñor pechiazul (*Luscinia svecica*) I  
Mirlo común (*Turdus merula*) R  
Cetia ruiñeñor (*Cettia cetti*) R  
Zarcero bereber (*Iduna opaca*) E  
Zarcero polígota (*Hippolais polyglotta*) E  
Carricero tordal (*Acrocephalus arundinaceus*) E  
Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*) R  
Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*) R  
Papamoscas gris (*Muscicapa striata*) P  
Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) P  
Mosquero común (*Phylloscopus collybita*) I  
Herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*) R  
Carbonero común (*Parus major*) R  
Pájaro-moscón europeo (*Remiz pendulinus*) R  
Urraca común (*Pica pica*) R  
Grajilla occidental (*Corvus monedula*) R  
Estornino negro (*Sturnus unicolor*) R  
Corrión común (*Passer domesticus*) R





# ¿Por qué venir a Badajoz a observar aves?



- ...s dubius) R
- ...go gallinago) I
- ...oleucos) I
- ...chropus) I
- ...phalus ridibundus) R
- ...melanocephalus) I \*muy rara
- ...delawarensis) I \*muy rara
- ...I \*muy rara
- ...cus) R
- ...michahellis) I \* muy rara
- ...us minutus) I \* muy rara
- ...la albifrons) E
- ...nias hybrida) E
- ...niger) E
- ...decaocto) R
- ...E
- ...us) E
- ...E
- ...lcedo atthis) R
- ...o rustica) E
- ...is daurica) E
- ...icum) E

- Lavandera blanca (*Motacilla alba*) I
- Petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*) I
- Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*) E
- Ruiseñor pechiazul (*Luscinia svecica*) I
- Mirlo común (*Turdus merula*) R
- Cetia ruiseñor (*Cettia cetti*) R
- Zarcero bereber (*Iduna opaca*) E
- Zarcero polígota (*Hippolais polyglotta*) E
- Carricero tordal (*Acrocephalus arundinaceus*) E
- Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*) R
- Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*) R
- Papamoscas gris (*Muscicapa striata*) P
- Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) P
- Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*) I
- Herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*) R
- Carbonero común (*Parus major*) R
- Pájaro-moscón europeo (*Remiz pendulinus*) R
- Urraca común (*Pica pica*) R
- Grajilla occidental (*Corvus monedula*) R
- Estornino negro (*Sturnus unicolor*) R
- Gorrión común (*Passer domesticus*) R



## (Puente de La Autonomía)

- Ánade azulón (*Anas platyrhynchos*) R
- Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*) E
- Avetorillo común (*Ixobrychus minutus*) R
- Martinete común (*Nycticorax nycticorax*) R
- Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*) R
- Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*) R
- Garceta común (*Egretta garzetta*) R
- Garceta grande (*Egretta alba*) I
- Garza real (*Ardea cinerea*) R
- Garza imperial (*Ardea purpurea*) E
- Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) E
- Morito común (*Plegadis falcinellus*) R
- Espátula común (*Platalea leucorodia*) R
- Milano negro (*Milvus migrans*) E
- Milano real (*Milvus milvus*) I
- Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*) R
- Cernícalo primilla (*Falco naumanni*) V
- Rascón europeo (*Rallus aquaticus*) R
- Gallineta común (*Gallinula chloropus*) R
- Calamíto común (*Porphyrio porphyrio*) R
- Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*) R
- Agachadiza común (*Gallinago gallinago*) I
- Andarríos chico (*Actitis hypoleucos*) I
- Andarríos grande (*Tringa ochropus*) I
- Gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*) R
- Gaviota sombría (*Larus fuscus*) R
- Fumarel cariblanco (*Chlidonia hybrida*) E
- Fumarel común (*Chlidonia niger*) E
- Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*) R
- Vencejo común (*Apus apus*) E
- Vencejo pálido (*Apus pallidus*) E
- Vencejo real (*Apus melba*) E
- Martín pescador común (*Alcedo atthis*) R
- Golondrina común (*Hirundo rustica*) E
- Avión común (*Delichon urbicum*) E
- Lavandera blanca (*Motacilla alba*) I
- Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*) E
- Mirlo común (*Turdus merula*) R
- Cetia ruiseñor (*Cettia cetti*) R
- Zarcero bereber (*Iduna opaca*) E
- Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*) R

Bienvenidos a Badajoz, una ciudad donde el conjunto de aves que puedes observar con facilidad es muy grande, ¡sólo tienes que proponértelo!

Encuentra la mejor época del año para venir, ellas (las aves), te están esperando.

Badajoz es la **única gran ciudad extremeña que cuenta con una ZEPA urbana** que la atraviesa por ello, todo son ventajas para tí.

Destaca no sólo por el gran número de especies, si no también, por las altas concentraciones que presenta. Por citar algunos ejemplos, apuntaremos que en el tramo comprendido entre el Puente de Palmas y el azud, han podido observarse todas las especies de **garzas ibéricas**, incluido el avetoro común, aunque destacan por su número las colonias reproductoras de **martinete común**, una especie que aquí además es invernante, en "armonía" con otras especies como **garcetas comunes** o **garcillas bueyeras**. Con suma facilidad podremos observar a la esquiua **garcilla cangrejera**, que suele permanecer inmóvil, posada en las islas de nenúfares o bien, junto a los **avetorillos** comunes en la espesura de los carrizos. Singularmente también aparece el **morito común**, que se trata del único ibis ibérico,

**E** — Estival, especie reproductora presente durante la primavera y el verano

**I** — Especie invernante

**P** — Especie presente durante los pasos migratorios

**\*** — Especie muy rara pero citada en ocasiones en el tramo donde nos encontramos



**(Paseo Fluvial)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos) P
- Cormorán grande (Phalacrocorax carolinensis) P
- Avetorillo común (Ixobrychus exilis) P
- Martinete común (Nycticorax nycticorax) P
- Garcilla cangrejera (Ardeola grayii) P
- Garcilla bueyera (Bubulixys senegalensis) P
- Garceta común (Egretta garzetta) P
- Garceta grande (Egretta albertina) P
- Garza real (Ardea cinerea) P
- Garza imperial (Ardea herodias) P
- Cigüeña blanca (Ciconia nigra) P
- Morito común (Plegadis falcinellus) P
- Espátula común (Platalia major) P
- Milano negro (Milvus migrans) E
- Milano real (Milvus forficatus) E
- Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
- Cernícalo primilla (Falco tinnunculus) P
- Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
- Gallineta común (Gallinula chloropus) R
- Calamón común (Porphyrio porphyrio) P
- Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) P
- Gaviota sombría (Larus fuscus) P
- Charrancito común (Streptopelia risoria) P
- Fumarel cariblanco (Chlorospiza alba) P
- Fumarel común (Chlorospiza trichorhoa) P
- Tórtola turca (Streptopelia turtur) P
- Vencejo común (Apus apus) E
- Vencejo pálido (Apus pallidus) E
- Vencejo real (Apus melba) E
- Martín pescador común (Alcedo atthis) R
- Colondrina común (Hirundo rustica) P

**(Puente Real)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos) P
- Cormorán grande (Phalacrocorax carolinensis) P
- Avetorillo común (Ixobrychus exilis) P
- Martinete común (Nycticorax nycticorax) P
- Garcilla cangrejera (Ardeola grayii) P
- Garcilla bueyera (Bubulixys senegalensis) P
- Garceta común (Egretta garzetta) P
- Garceta grande (Egretta albertina) P
- Garza real (Ardea cinerea) P
- Carbonero común (Parus major) R
- Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
- Abujincho común (Upupa epops) R
- Abujincho europeo (Upupa epops) R

**(Ambos lados del Azud Del Guadiana)**

- Silbón europeo (Anas penelope) I
- Ánade friso (Anas strepera) I
- Cerceta común (Anas crecca) I y P
- Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
- Ánade rabudo (Anas acuta) I

- Milano negro (Milvus migrans) E
- Milano real (Milvus forficatus) I
- Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
- Águila calzada (Aquila pennata) E
- Águila pescadora (Pandion haliaetus) R
- Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
- Gallineta común (Gallinula chloropus) R
- Abujincho común (Upupa epops) R
- Abujincho europeo (Upupa epops) R

- Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
- Vencejo común (Apus apus) E
- Vencejo pálido (Apus pallidus) E
- Vencejo real (Apus melba) E
- Martín pescador común (Alcedo atthis) R
- Abejaruco europeo (Merops apiaster) E
- Abujincho común (Upupa epops) R
- Abujincho europeo (Upupa epops) R

- Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
- Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
- Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
- Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
- Carbonero común (Parus major) R
- Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
- Abujincho común (Upupa epops) R
- Abujincho europeo (Upupa epops) R



**(Paseo Fluvial)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
- Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
- Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
- Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
- Garceta común (Egretta garzetta) R
- Garceta grande (Egretta alba) I
- Garza real (Ardea cinerea) R
- Garza imperial (Ardea purpurea) E
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
- Morito común (Plegadis falcinellus) R
- Espátula común (Platalea leucorodia) R
- Milano negro (Milvus migrans) E
- Milano real (Milvus milvus) I
- Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
- Cernícalo primilla (Falco naumanni) V
- Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
- Gallineta común (Gallinula chloropus) R
- Calamón común (Porphyrio porphyrio) R
- Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) R
- Gaviota sombría (Larus fuscus) R
- Charrancito común (Sternula albifrons) E
- Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) R
- Fumarel común (Chlidonias niger) E
- Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
- Vencejo común (Apus apus) E
- Vencejo pálido (Apus pallidus) E
- Vencejo real (Apus melba) E
- Martín pescador común (Alcedo atthis) R
- Golondrina común (Hirundo rustica) E

**(Puente Real)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
- Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
- Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
- Garza real (Ardea cinerea) R
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E

- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
- Mirlo común (Turdus merula) R
- Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
- Zarcero bereber (Iduna opaca) E
- Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
- Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) R
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
- Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
- Carbonero común (Parus major) R
- Urraca común (Pica pica) R
- Grajilla occidental (Corvus monedula) R
- Estornino negro (Sturnus unicolor) R
- Gorrión común (Passer domesticus) R

- Avión común (Delichon urbicum) E
- Lavandera blanca (Motacilla alba) I
- Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) I
- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
- Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) I
- Mirlo común (Turdus merula) R
- Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
- Zarcero bereber (Iduna opaca) E
- Zarcero poliglota (Hippolais polyglotta) E
- Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
- Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
- Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) P
- Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
- Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
- Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
- Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
- Carbonero común (Parus major) R
- Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
- Agateador europeo (Certhia brachydactyla) R
- Oropéndola europea (Oriolus oriolus) E
- Alcaudón común (Lanius senator) E
- Urraca común (Pica pica) R
- Grajilla occidental (Corvus monedula) R
- Estornino negro (Sturnus unicolor) R
- Gorrión común (Passer domesticus) R
- Estrilda común (Estrilda astrild) R
- Bengalí rojo (Amandava amandava) R
- Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) R
- Serín verdicillo (Serinus serinus) R
- Verderón común (Chloris chloris) R
- Jilguero europeo (Carduelis carduelis) R
- Jilguero lúgano (Carduelis spinus) I

- Martín pescador común (Alcedo atthis) R
- Golondrina común (Hirundo rustica) E
- Avión común (Delichon urbicum) E
- Lavandera blanca (Motacilla alba) I
- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
- Mirlo común (Turdus merula) R
- Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
- Zarcero bereber (Iduna opaca) E
- Zarcero poliglota (Hippolais polyglotta) E
- Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
- Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
- Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P

nes en la espesura de los carrizos. Singularmente también aparece el **morito común**, que se trata del único ibis ibérico, cuya la población crece año tras año llegando en la actualidad casi al millar de individuos. También es fácil de detectar el **calamón común**, su azul intenso destacará en los reflejos del Guadiana y nos hará detener en él la mirada.

Aguas abajo del azud encontramos una importante colonia mixta de **abejarucos europeos** y **aviones zapadores**, que se mueven por todo el río en busca de los insectos que constituyen su dieta.

Sin embargo existen otras aves más discretas, que son las más buscadas por los ornitólogos expertos, como es el caso del **zarcero bereber**, que cuenta con una importante población en la zona, aunque deberemos de estar atentos a su canto para poder detectarlo, puesto que su plumaje es críptico entre la vegetación de ribera. Otra especie discreta es el **pájaro moscón**, cuyos nidos colgantes pueden observarse incluso desde los paseos urbanos. Durante la primavera y el verano los corros de tres especies de **vencejos** surcan las aguas bajo los ojos de los puentes: **vencejo pálido, común** y el maravilloso **vencejo real**, que cuenta con dos importantes colonias en el puente de Palmas y el Puente de la Autonomía.

Durante el invierno la balsa de agua del azud congrega gran cantidad de **cormoranes grandes, gaviotas reidoras y sombrías**, y diferentes especies de **patos**, pero sin duda la presencia de algunas rapaces como el **halcón peregrino**, que descansa en una de las grandes pilas de la Puente Real o el **águila pescadora** que frecuenta la zona desde la cola del embalse de Alqueva, donde se reproducen varias parejas que prefieren ascender por las aguas del Guadiana y hacer las delicias de los ornitólogos que frecuentan la zona. Si

- Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
- Vencejo común (Apus apus) E
- Vencejo pálido (Apus pallidus) E
- Vencejo real (Apus melba) E
- Martín pescador común (Alcedo atthis) R
- Abejaruco europeo (Merops apiaster) E
- Abubilla (Upupa epops) R
- Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
- Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
- Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
- Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
- Carbonero común (Parus major) R
- Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R

Navigation icons: Home, Back, Forward, Search, Print, Zoom in, Zoom out, Full screen.

**5** Azud margen izquierda (colonias de garzas).

**6** Azud margen derecha (vista de aves entrando al dormitorio).

**R** Residente todo el año

**E** Estival, especie reproductora presente durante la primavera y el verano

**I** Especie invernante

**P** Especie presente durante los pasos migratorios

**\*** Especie muy rara pero citada en ocasiones en el tramo donde nos encontramos



**(Paseo Fluvial)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos)
- Cormorán grande (Phalacrocorax carolinensis)
- Avetorillo común (Ixobrychus exilis)
- Martinete común (Nycticorax nycticorax)
- Garcilla cangrejera (Arcobrychus exilis)
- Garcilla bueyera (Bubulivus ibis)
- Garceta común (Egretta garzetta)
- Garceta grande (Egretta alba)
- Garza real (Ardea cinerea)
- Garza imperial (Ardea herodias)
- Cigüeña blanca (Ciconia nigra)
- Morito común (Plegadis falcinellus)
- Espátula común (Platya leucostomus)
- Milano negro (Milvus forficatus)
- Milano real (Milvus milvus)
- Aguilucho lagunero occidental (Circus melanoleucos)
- Cernícalo primilla (Falco tinnunculus)
- Rascón europeo (Rallus collinus)
- Gallineta común (Gallinago gallinago)
- Calamón común (Porzana porzana)
- Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
- Gaviota sombría (Larus fuscus)
- Charranco común (Sturnella sylvia)
- Fumarel cariblanco (Chroicocephalus ridibundus)
- Fumarel común (Chlidias leucorhynchos)
- Tórtola turca (Streptopelia turtur)
- Vencejo común (Apus melanocephalus)
- Vencejo pálido (Apus pallens)
- Vencejo real (Apus melanocephalus)
- Martín pescador común (Alcedo inaequalis)
- Golondrina común (Hirundo rustica)



**(Paseo Fluvial)**

- Ánade azulón (*Anas platyrhynchos*) R
- Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*) E
- Avetorillo común (*Ixobrychus minutus*) R
- Martinete común (*Nycticorax nycticorax*) R
- Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*) R
- Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*) R
- Garceta común (*Egretta garzetta*) R
- Garceta grande (*Egretta alba*) I
- Garza real (*Ardea cinerea*) R
- Garza imperial (*Ardea purpurea*) E
- Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) E
- Morito común (*Plegadis falcinellus*) R
- Espátula común (*Platalea leucorodia*) R
- Milano negro (*Milvus migrans*) E
- Milano real (*Milvus milvus*) I
- Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*) R
- Cernícalo primilla (*Falco naumanni*) V
- Rascón europeo (*Rallus aquaticus*) R
- Gallineta común (*Gallinula chloropus*) R
- Calamón común (*Porphyrio porphyrio*) R
- Gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*) R
- Gaviota sombría (*Larus fuscus*) R
- Charrancito común (*Sterna albifrons*) E
- Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybrida*) E
- Fumarel común (*Chlidonias niger*) E
- Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*) R

- Andarrios chico (*Actitis hypoleucos*) I
- Andarrios grande (*Tringa ochropus*) I
- Gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*) R
- Gaviota sombría (*Larus fuscus*) R
- Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybrida*) E
- Fumarel común (*Chlidonias niger*) E
- Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*) R
- Vencejo común (*Apus apus*) E
- Vencejo pálido (*Apus pallidus*) E
- Vencejo real (*Apus melba*) E
- Martín pescador común (*Alcedo atthis*) R
- Golondrina común (*Hirundo rustica*) E
- Avión común (*Delichon urbicum*) E
- Lavandera blanca (*Motacilla alba*) I
- Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*) E
- Mirlo común (*Turdus merula*) R
- Cetia ruiseñor (*Cettia cetti*) R
- Zarcero bereber (*Iduna opaca*) E
- Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*) R
- Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*) R
- Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*) I
- Herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*) R
- Carbonero común (*Parus major*) R
- Urraca común (*Pica pica*) R
- Grajilla occidental (*Corvus monedula*) R
- Estornino negro (*Sturnus unicolor*) R
- Gorrion común (*Passer domesticus*) R

- Avión común (*Delichon urbicum*) E
- Lavandera blanca (*Motacilla alba*) I
- Petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*) I
- Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*) E
- Ruiseñor pechiazul (*Luscinia svecica*) I
- Mirlo común (*Turdus merula*) R
- Cetia ruiseñor (*Cettia cetti*) R
- Zarcero bereber (*Iduna opaca*) E
- Zarcero polígota (*Hippolais polyglotta*) E
- Carricero tordal (*Acrocephalus arundinaceus*) E
- Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*) R
- Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*) R
- Papamoscas gris (*Muscicapa striata*) P
- Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) P
- Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*) I
- Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*) P
- Herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*) R
- Carbonero común (*Parus major*) R
- Pájaro-moscón europeo (*Remiz pendulinus*) R
- Agateador europeo (*Certhia brachydactyla*) R
- Oropéndola europea (*Oriolus oriolus*) E
- Alcaudón común (*Lanius senator*) E
- Urraca común (*Pica pica*) R
- Grajilla occidental (*Corvus monedula*) R
- Estornino negro (*Sturnus unicolor*) R
- Gorrion común (*Passer domesticus*) R
- Estrilda común (*Estrilda astrild*) R
- Bengalí rojo (*Amandava amandava*) R
- Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*) R
- Serín verdicillo (*Serinus serinus*) R
- Verderón común (*Chloris chloris*) R
- Jilguero europeo (*Carduelis carduelis*) R
- Jilguero lúgano (*Carduelis spinus*) I raro


incluido el avetoro común, aunque destacan por su número las colonias reproductoras de **martinete común**, una especie que aquí además es invernante, en "armonía" con otras especies como **garcetas comunes** o **garcillas bueyeras**. Con suma facilidad podremos observar a la izquierda **garcilla cangrejera**, que suele permanecer inmóvil, posada en las islas de nenúfares o bien, junto a los **avetorillos** comunes en la espesura de los carrizos. Singularmente también aparece el **morito común**, que se trata del único ibis ibérico, cuya la población crece año tras año llegando en la actualidad casi al millar de individuos. También es fácil de detectar el **calamón común**, su azul intenso destacará en los reflejos del Guadiana y nos hará detener en él la mirada.

Aguas abajo del azud encontramos una importante colonia mixta de **abejarucos europeos** y **aviones zapadores**, que se mueven por todo el río en busca de los insectos que constituyen su dieta.

Sin embargo existen otras aves más discretas, que son las más buscadas por los ornitólogos expertos, como es el caso del **zarcero bereber**, que cuenta con una importante población en la zona, aunque deberemos de estar atentos a su canto para poder detectarlo, puesto que su plumaje es críptico entre la vegetación de ribera. Otra especie discreta es el **pájaro moscón**, cuyos nidos colgantes pueden observarse incluso desde los paseos urbanos. Durante la primavera y el verano los corros de tres especies de **vencejos** surcan las aguas bajo los ojos de los puentes: **vencejo pálido**, **común** y el maravilloso **vencejo real**, que cuenta con dos importantes colonias en el puente de Palmas y el Puente de la Autonomía.

Durante el invierno la balsa de agua del azud congrega gran cantidad de **cormoranes grandes**, **gaviotas reidoras** y **som-**

Navigation icons: Home, Print, Back, Forward, Page 1 / 2, Zoom In, Zoom Out, Full Screen.



**(Paseo Fluvial)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos)
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
- Avetorillo común (Ixobrychus minutus)
- Martinete común (Nycticorax nycticorax)
- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)
- Garceta común (Egretta garzetta)
- Garceta grande (Egretta alba)
- Garza real (Ardea cinerea)
- Garza imperial (Ardea herodias)
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
- Morito común (Plegadis falcinellus)
- Espátula común (Platalea leucorodia)
- Milano negro (Milvus forficatus)
- Milano real (Milvus milvus)
- Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)
- Cernícalo primilla (Falco tinnunculus)
- Rascón europeo (Rallus aquaticus)
- Gallineta común (Gallinula chloropus)
- Calamón común (Porphyrio porphyrio)
- Porrión europeo (Aythya ferina)
- Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
- Tórtola turca (Streptopelia turtur)
- Vencejo común (Apus apus)
- Vencejo pálido (Apus pallidus)
- Vencejo real (Apus melba)
- Martín pescador común (Alcedo atthis)
- Colondrina común (Hirundo rustica)

**(Puente Real)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos)
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
- Avetorillo común (Ixobrychus minutus)
- Martinete común (Nycticorax nycticorax)
- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)
- Garceta común (Egretta garzetta)
- Garza real (Ardea cinerea)
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
- Morito común (Plegadis falcinellus)
- Milano negro (Milvus forficatus)
- Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)
- Cernícalo primilla (Falco tinnunculus)
- Halcón peregrino (Falco peregrinus)
- Gallineta común (Gallinula chloropus)
- Calamón común (Porphyrio porphyrio)
- Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
- Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida)
- Tórtola turca (Streptopelia turtur)
- Vencejo común (Apus apus)
- Vencejo pálido (Apus pallidus)
- Vencejo real (Apus melba)
- Martín pescador común (Alcedo atthis)
- Colondrina común (Hirundo rustica)

6

5

5

6


**(Ambos lados del Azud Del Guadiana)**

- Silbón europeo (Anas penelope) I
- Ánade friso (Anas strepera) I
- Cerceta común (Anas crecca) I y P
- Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
- Ánade rabudo (Anas acuta) I
- Cuchara común (Anas clypeata) I
- Porrión europeo (Aythya ferina) I
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
- Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
- Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
- Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
- Garceta común (Egretta garzetta) R
- Garceta grande (Egretta alba) I
- Garza real (Ardea cinerea) R
- Garza imperial (Ardea purpurea) E
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
- Morito común (Plegadis falcinellus) R
- Espátula común (Platalea leucorodia) R

- Milano negro (Milvus migrans) E
- Milano real (Milvus milvus) I
- Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
- Águila calzada (Aquila pennata) E
- Águila pescadora (Pandion haliaetus) R
- Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
- Gallineta común (Gallinula chloropus) R
- Canastera común (Clareola pratincola) E
- Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) E
- Combatiente (Philomachus pugnax) P
- Agachadiza común (Gallinago gallinago) I
- Chorlito chico (Charadrius dubius) R
- Chorlito grande (Charadrius hiaticula) P
- Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria) I
- Avefría europea (Vanellus vanellus) R
- Calamón común (Porphyrio porphyrio) R
- Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) R
- Gaviota sombría (Larus fuscus) R
- Charrancito común (Sternula albifrons) E
- Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) E
- Fumarel común (Chlidonias niger) E

- Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
- Vencejo común (Apus apus) E
- Vencejo pálido (Apus pallidus) E
- Vencejo real (Apus melba) E
- Martín pescador común (Alcedo atthis) R
- Abejaruco europeo (Merops apiaster) E
- Abubilla (Upupa epops) R
- Colondrina común (Hirundo rustica) E
- Avión común (Delichon urbicum) E
- Avión zapador (Riparia riparia) E
- Lavandera blanca (Motacilla alba) I
- Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) I
- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
- Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) I
- Mirlo común (Turdus merula) R
- Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
- Zarcero bereber (Iduna opaca) E
- Zarcero polígloa (Hippolais polyglotta) E
- Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
- Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
- Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) R

- Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
- Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
- Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
- Herriero común (Cyanistes caeruleus) R
- Carbonero común (Parus major) R
- Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
- Agateador europeo (Certhia brachydactyla) R
- Oropéndola europea (Oriolus oriolus) E
- Alcaudón común (Lanius senator) E
- Urraca común (Pica pica) R
- Grajilla occidental (Corvus monedula) R
- Estornino negro (Sturnus unicolor) R
- Corrión común (Passer domesticus) R
- Estrilda común (Estrilda astrild) R
- Bengalí rojo (Amandava amandava) R
- Perín vulgar (Fringilla coelebs) R
- Serín verdicillo (Serinus serinus) R
- Verderón común (Chloris chloris) R
- Jilguero europeo (Carduelis carduelis) R
- Jilguero lúgano (Carduelis spinus) I\* raro



**(Paseo Fluvial)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
- Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
- Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
- Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
- Garceta común (Egretta garzetta) R
- Garceta grande (Egretta alba) I
- Garza real (Ardea cinerea) R
- Garza imperial (Ardea purpurea) E
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
- Morito común (Plegadis falcinellus) R
- Espátula común (Platalea leucorodia) R
- Milano negro (Milvus migrans) E
- Milano real (Milvus milvus) I
- Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
- Cernícalo primilla (Falco naumanni) V
- Rascón europeo (Rallus aquaticus) R
- Gallineta común (Gallinula chloropus) R
- Calamón común (Porphyrio porphyrio) R
- Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) R
- Gaviota sombría (Larus fuscus) R
- Charrancito común (Sternula albifrons) E
- Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) E
- Fumarel común (Chlidonias niger) E
- Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
- Vencejo común (Apus apus) E
- Vencejo pálido (Apus pallidus) E
- Vencejo real (Apus melba) E
- Martín pescador común (Alcedo atthis) R
- Golondrina común (Hirundo rustica) E

**(Puente Real)**

- Ánade azulón (Anas platyrhynchos) R
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) E
- Avetorillo común (Ixobrychus minutus) R
- Martinete común (Nycticorax nycticorax) R
- Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) R
- Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) R
- Garceta común (Egretta garzetta) R
- Garceta grande (Egretta alba) I
- Garza real (Ardea cinerea) R
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) E
- Morito común (Plegadis falcinellus) R
- Milano negro (Milvus migrans) E
- Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) R
- Alcaudón común (Lanius senator) E
- Urraca común (Pica pica) R
- Grajilla occidental (Corvus monedula) R
- Estornino negro (Sturnus unicolor) R
- Gorrión común (Passer domesticus) R
- Estrilda común (Estrilda astrild) R
- Bengalí rojo (Amandava amandava) R
- Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) R
- Serín verdicillo (Serinus serinus) R
- Verderón común (Chloris chloris) R
- Jilguero europeo (Carduelis carduelis) R
- Jilguero lúgano (Carduelis spinus) I\* raro

- Avión común (Delichon urbicum) E
- Lavandera blanca (Motacilla alba) I
- Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) I
- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
- Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) I
- Mirlo común (Turdus merula) R
- Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
- Zarcero bereber (Iduna opaca) E
- Zarcero polígota (Hippolais polyglotta) E
- Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
- Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
- Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) R
- Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
- Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
- Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
- Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
- Carbonero común (Parus major) R
- Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
- Agateador europeo (Certhia brachydactyla) R
- Oropéndola europea (Oriolus oriolus) E
- Alcaudón común (Lanius senator) E
- Urraca común (Pica pica) R
- Grajilla occidental (Corvus monedula) R
- Estornino negro (Sturnus unicolor) R
- Gorrión común (Passer domesticus) R
- Estrilda común (Estrilda astrild) R
- Bengalí rojo (Amandava amandava) R
- Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) R
- Serín verdicillo (Serinus serinus) R
- Verderón común (Chloris chloris) R
- Jilguero europeo (Carduelis carduelis) R
- Jilguero lúgano (Carduelis spinus) I raro

- ...s) E
- ...al (Circus aeruginosus) R
- ...ata) E
- ...aliaetus) R
- ...aticus) R
- ...horopus) R
- ...paratincola) E
- ...pus himantopus) R
- ...ugnax) P
- ...o gallinago) I
- ...ubius) R
- ...hiaticus) P
- ...ivialis apricaria) I
- ...nellus) R
- ...porphyrio) R
- ...halus ridibundus) R
- ...us) R
- ...a albifrons) E
- ...as hybrida) E
- ...niger) E

- Tórtola turca (Streptopelia decaocto) R
- Vencejo común (Apus apus) E
- Vencejo pálido (Apus pallidus) E
- Vencejo real (Apus melba) E
- Martín pescador común (Alcedo atthis) R
- Abejaruco europeo (Merops apiaster) E
- Abubilla (Upupa epops) R
- Golondrina común (Hirundo rustica) E
- Avión común (Delichon urbicum) E
- Avión zapador (Riparia riparia) E
- Lavandera blanca (Motacilla alba) I
- Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) I
- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) E
- Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) I
- Mirlo común (Turdus merula) R
- Cetia ruiseñor (Cettia cetti) R
- Zarcero bereber (Iduna opaca) E
- Zarcero polígota (Hippolais polyglotta) E
- Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) E
- Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) R
- Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) R

- Papamoscas gris (Muscicapa striata) P
- Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) P
- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) I
- Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) P
- Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) R
- Carbonero común (Parus major) R
- Pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus) R
- Agateador europeo (Certhia brachydactyla) R
- Oropéndola europea (Oriolus oriolus) E
- Alcaudón común (Lanius senator) E
- Urraca común (Pica pica) R
- Grajilla occidental (Corvus monedula) R
- Estornino negro (Sturnus unicolor) R
- Gorrión común (Passer domesticus) R
- Estrilda común (Estrilda astrild) R
- Bengalí rojo (Amandava amandava) R
- Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) R
- Serín verdicillo (Serinus serinus) R
- Verderón común (Chloris chloris) R
- Jilguero europeo (Carduelis carduelis) R
- Jilguero lúgano (Carduelis spinus) I\* raro

importante colonia mixta de **abejarucos europeos** y **aviones zapadores**, que se mueven por todo el río en busca de los insectos que constituyen su dieta.

Sin embargo existen otras aves más discretas, que son las más buscadas por los ornitólogos expertos, como es el caso del **zarcero bereber**, que cuenta con una importante población en la zona, aunque deberemos de estar atentos a su canto para poder detectarlo, puesto que su plumaje es críptico entre la vegetación de ribera. Otra especie discreta es el **pájaro moscón**, cuyos nidos colgantes pueden observarse incluso desde los paseos urbanos. Durante la primavera y el verano los corros de tres especies de **vencejos** surcan las aguas bajo los ojos de los puentes: **vencejo pálido**, **común** y el maravilloso **vencejo real**, que cuenta con dos importantes colonias en el puente de Palmas y el Puente de la Autonomía.

Durante el invierno la balsa de agua del azud congrega gran cantidad de **cormoranes grandes**, **gaviotas reidoras** y **sombrías**, y diferentes especies de **patos**, pero sin duda la presencia de algunas rapaces como el **halcón peregrino**, que descansa en una de las grandes pilastras del Puente Real o el **águila pescadora** que frecuenta la zona desde la cola del embalse de Alqueva, donde se reproducen varias parejas que prefieren ascender por las aguas del Guadiana y hacer las delicias de los ornitólogos que frecuentan la zona. Si tenemos paciencia también será posible observar **aguiluchos laguneros** y **pálidos** que frecuentan un dormitorio invernal cercano al río.

Ahora ya conoces algunas de las joyas ornitológicas de la ciudad, solo necesitas venir a observarlas.

Juan Pablo Prieto Clemente





BAJAJAZ  
CIUDAD DE LAS AVES

### Somormujo lavanco *Podiceps cristatus*



**Descripción:** cuello esbelto, largo y fino, con pico largo y fino también. Cabeza coronada por una plumas oscuras a modo de "penachos", plumas castaño-rojizas a ambos lados de la cara. Cuando nada solo asoma un tercio del dorso y el cuello.

**Estatus:** residente común.

**Hábitat:** medios acuáticos tales como lagunas, embalses, ríos de corriente lenta...

### Avetorillo común *Ixobrychus minutus*



**Descripción:** la más pequeña de las garzas ibéricas, el macho posee el píleo y el dorso negro, con grandes manchas alares claras: blanco-ocráceo. La hembra presenta un plumaje pardo listado que le camufla perfectamente en el eneal.

**Estatus:** reproductor común con nume...

### Cormorán grande *Phalacrocorax carbo*



**Descripción:** ave grande, con el cuello largo y grueso, al igual que el pico. Los adultos son muy oscuros, con irros verde y mancha amarillo anaranjada en la garganta, que se extiende sobre blanco. Carece de glándula uropigial, por lo que no puede impermeabilizar sus plumas y necesita secarlas al sol en posaderos de la orilla.

**Estatus:** principalmente invernante, aunque cada vez anidan más parejas en embalses del Guadiana.

**Hábitat:** totalmente ligado al medio acuático.

### Elanio azul *Elanus caeruleus*



### Pájaro-moscón europeo *Remiz pendulinus*



**Descripción:** más pequeño que un gorrión, cabeza gris con antifaz negro más extenso en machos. Dorso de color marrón rojizo y y partes inferiores ocráceas claras.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** frecuenta la vegetación ribereña, principalmente saucedas, eneales y carrizales.

### Calamón común *Porphyrio porphyrio*



**Descripción:** gallineta de gran tamaño de color azul intenso con reflejos. Pico, escudete y patas de color rojo coral.

### Morito común *Plegadis falcinellus*



**Descripción:** ave oscura de patas y cuello largo, con el pico también largo y curvado hacia abajo. Al incidir la luz se observan irisaciones en su plumaje de tonos verdosos y violáceos. En época de reproducción el tono se vuelve vinoso, rojizo con lista clara desde el ojo hacia el pico.

**Estatus:** aunque en el resto de España es reproductor estival, en esta zona permanece todo el año.

**Hábitat:** arrozales, lagunas con vegetación palustre, zonas de poca corriente...

### Cernícalo primilla *Falco naumanni*



### Águila pescadora *Pandion haliaetus*



### Cigüeñuela común *Himantopus himantopus*



**Descripción:** pequeña ave con dimorfismo sexual. El macho presenta plumaje grisáceo, hombros más oscuros y partes inferiores con un dibujo con pintas redondas. Las partes superiores son moteadas, extremidades inferiores con...

**Estatus:** reproductor común...

### Pájaro-moscón europeo

*Remiz pendulinus*



**Descripción:** más pequeño que un gorrión, cabeza gris con antifaz negro más extenso en machos. Dorso de color marrón rojizo y partes inferiores ocráceas claras.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** frecuenta la vegetación ribereña, principalmente saucedas, eneaes y carrizales.

### Calamón común

*Porphyrio porphyrio*



**Descripción:** gallineta de gran tamaño de color azul intenso con reflejos. Pico, escudete y patas de color rojo coral.

### Morito común

*Plegadis falcinellus*



**Descripción:** ave oscura de patas y cuello largo, con el pico también largo y curvado hacia abajo. Al incidir la luz se observan irisaciones en su plumaje de tonos verdosos y violáceos. En época de reproducción el tono se vuelve vinoso, rojizo con lista clara desde el ojo hacia el pico.

**Estatus:** aunque en el resto de España es reproductor estival, en esta zona permanece todo el año.

**Hábitat:** arrozales, lagunas con vegetación palustre, zonas de poca corriente...

### Águila pescadora

*Pandion haliaetus*



**Descripción:** águila de tamaño medio-grande, con partes inferiores muy claras que contrastan con las superiores oscuras. Cara blanca con "antifaz" oscura y pileo blanco. Franja pectoral difusa, oscura.

**Estatus:** principalmente invernante, aunque tras las reintroducciones por el método hatching en Portugal, se observan ejemplares durante todo el año.

**Hábitat:** frecuenta grandes masas de agua, embalses, charcas, ríos de gran caudal...

### Cigüeñuela común

*Himantopus himantopus*



**Descripción:** muy esbelta y elegante, de pico muy fino y patas larguísimas de color rosa oscuro intenso. Alas y hombros de color pizarra oscuro, mientras que las partes inferiores son de color blanco puro.

**Estatus:** residente, aunque durante el invierno se incrementa la población con ejemplares venidos del norte.

**Hábitat:** aguas tranquilas y poco profundas.

### aguilucho lagunero occidental

*Circus aeruginosus*



**Descripción:** rapaz de tamaño medio, es el mayor de los aguiluchos ibéricos. Presenta un dimorfismo sexual marcado, siendo las hembras de color marrón oscuro con hombros, pileo, nica y garganta de color crema, mientras que el macho presenta cuerpo marrón, alas y cabeza gris y puntas negras.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** ligado a los medios acuáticos de aguas lentas o tranquilas, arrozales, lagunas...

### Cernícalo primilla

*Falco naumanni*



**Descripción:** pequeño halconcillo urbano, con dimorfismo sexual marcado. El macho presenta cabeza azulada y alas grises, hombros marrón teja sin motas, y partes inferiores de color crema moteado con pintas redondeadas. La hembra partes superiores marrón parduzco y partes inferiores amarillentas.

**Estatus:** reproductor estival.

### Gaviota sombría


*Larus fuscus*



**Descripción:** gaviota de gran tamaño. Los adultos presentan alas y dorso de color pizarra muy oscuro, y partes inferiores, cabeza y cuello claros. Pico amarillo con punto rojo en el extremo inferior.

**Estatus:** invernante.

**Hábitat:** zonas abiertas y cultivos



**Estatus:** reproductor común con numerosos invernantes en la zona.  
**Hábitat:** vegetación acuática, eneales, carrizales...



**Estatus:** residente.  
**Hábitat:** aguas quietas con abundante vegetación, tanto flotante como de orla.



**Hábitat:** anida e frecuente zonas pastizales.

**Martinete común**  
*Nycticorax nycticorax*



**Descripción:** garza de mediano tamaño de color gris con píleo y dorso negro con dos plumas occipitales blancas y largas. Destacan sus enormes ojos rojos adaptados a la visión crepuscular y nocturna.

**Estatus:** principalmente estival, aunque en la Zepa Azud de Badajoz se quedan numerosos ejemplares durante todo el invierno.

**Hábitat:** todo tipo de masas de agua, también corrientes, acostumbra a ocultarse en la vegetación de las orillas, aunque frecuenta pesqueras y posaderos en medio de ríos y embalses.

**Descripción:** rapaz pequeña, de tonos claros (blancos y grises), con "hombros" negros y ojos rojos, adaptados a la visión crepuscular.

**Estatus:** residente.  
**Hábitat:** terrenos abiertos con árboles dispersos, dehesas, cultivos...

**Garza imperial**  
*Ardea purpurea*



**Descripción:** garza grande, de cuello muy largo y aspecto "reptilíneo", de color marrón rayado de negro con dorso y alas de color gris violáceo.

**Estatus:** reproductor estival.  
**Hábitat:** eneales, carrizales, aguas de corriente lenta con abundante vegetación.

**Milano negro**  
*Milvus migrans*



**Descripción:** rapaz de tamaño medio, de cuerpo oscuro, cabeza clara y punteada, alas y cola larga terminada en escotadura.

**Estatus:** reproductor estival, con escasos ejemplares invernantes en el vertedero cercano.  
**Hábitat:** generalista, frecuenta cultivos, embalses, dehesas, pinares...

**Águila calzada**  
*Aquila pennata*



**Descripción:** la menor de las águilas ibéricas, presenta los tarsos emplumados "calzas", hasta los dedos. Esta especie cuenta con dos morphos: claro y oscuro. El claro presenta partes inferiores pálidas, blanquecinas con moteado pardo o gris y partes superiores oscuras. El morfo oscuro presenta las partes inferiores de color marrón oscuro y partes superiores oscuras también. Cola cuadrangular.

**Estatus:** principalmente reproductor estival, aunque en la zona suelen quedarse algunos ejemplares aislados durante el invierno.

**Hábitat:** dehesas, campos cultivados con retazos de vegetación original, márgenes de ríos, pinares...

**Vencejo real**  
*Apus melba*



**Descripción:** el n ibéricos, de color vientre y garganta Alas largas y afilada quillada.

**Estatus:** reproductor estival, aunque en la zona suelen quedarse algunos ejemplares aislados durante el invierno.

**Hábitat:** cría en edificios o cantile: rir la cercanía de r

**Garcilla cangrejera**  
*Ardeola ralloides*



**Descripción:** garza pequeña de pico azulado con punta negra y plumaje ocráceo con plumas de la nuca alargadas y patentes. Cuello largo

**Avefría europea**  
*Vanellus vanellus*



**Descripción:** del tamaño de una paloma doméstica, partes superiores muy oscuras con irisaciones verdosas y violáceas. Partes inferiores blancas limpias. Presen-

**Gallineta común**  
*Gallinula chloropus*



muy destacada.  
as con abundante  
ante como de orla.



**Hábitat:** anida en hueco de edificios, frecuente zonas agrarias despejadas y pastizales.



**Hábitat:** zonas abiertas y cultivos próximos a grandes masas de agua. También frecuente vertederos.



de tamaño medio,  
eza clara y puntea-  
terminada en esco-  
estival, con esca-  
nantes en el verte-  
frecuenta cultivos,  
inares...

**Águila calzada**  
*Aquila pennata*



**Descripción:** la menor de las águilas ibéricas, presenta los tarsos emplumados "calzas", hasta los dedos. Esta especie cuenta con dos morphos: claro y oscuro. El claro presenta partes inferiores pálidas, blanquecinas con moteado pardo o gris y partes superiores oscuras. El morfo oscuro presenta las partes inferiores de color marrón oscuro y partes superiores oscuras también. Cola cuadrangular.

**Estatus:** principalmente reproductor estival, aunque en la zona suelen quedarse algunos ejemplares aislados durante el invierno.

**Hábitat:** dehesas, campos cultivados con retazos de vegetación original, márgenes de ríos, pinares...

**Descripción:** del tamaño de una paloma doméstica, partes superiores muy oscuras con irisaciones verdosas y violáceas. Partes inferiores blancas limpias. Presen-

**Vencejo real**  
*Apus melba*



**Descripción:** el mayor de los vencejos ibéricos, de color marrón oscuro con vientre y garganta de color blanco puro. Alas largas y afiladas, y cola corta ahorquillada.

**Estatus:** reproductor estival.

**Hábitat:** cría en grietas o fisuras de edificios o cantiles rocosos, suele preferir la cercanía de masas de agua.

**Chorlitejo chico**  
*Charadrius dubius*



**Descripción:** limícola de pequeño tamaño, de pico corto y fino. Presenta anillo ocular amarillo intenso, más patente en época reproductora. Partes superiores marrón claro que contrastan con las inferiores blancas, banda pectoral y antifaz oscura.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** orillas limosas, lagunas pandas, arenales encharcadizos...

**Serín verdicillo**  
*Serinus serinus*



**Descripción:** algo menor que un canario, de color verdoso amarillento listado. Pico muy corto, cola ahorquillada. El macho es más amarillento en el periodo reproductor, mientras que la hembra presenta tonos verdosos más discretos.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** generalista, puede observarse en jardines, setos, cultivos, zonas abiertas, dehesas, bosques de coníferas.

**Martín pescador común**  
*Alcedo atthis*



**Descripción:** de tamaño similar al

**Gallineta común**  
*Gallinula chloropus*



Nuevo Presentación de Microsoft PowerPoint - PowerPoint



**Andarrios chico**  
*Actitis hypoleucos*



**Descripción:** limícola de pequeño tamaño, de partes superiores marrón

Buscar "Añadir vínculo"

- Exportar archivo PDF
- Crear archivo PDF
- Editar PDF
- Comentar
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Censurar
- Proteger
- Optimizar PDF
- Rellenar y firmar
- Enviar para revisar
- Más herramientas

Almacene y comparta archivos en Document Cloud Más información

# BAJAJOZ

CIUDAD DE LAS AVES

Fotografía: JUAN PABLO PRIETO



**Hábitat:** terrenos abiertos con árboles dispersos, dehesas, cultivos...

### Garza imperial

*Ardea purpurea*



**Descripción:** garza de mediano tamaño de color gris con píleo y dorso negro con dos plumas occipitales blancas y largas. Destacan sus enormes ojos rojos adaptados a la visión crepuscular y nocturna.

**Estatus:** principalmente estival, aunque en la Zepa Azud de Badajoz se quedan numerosos ejemplares durante todo el invierno.

**Hábitat:** todo tipo de masas de agua, también corrientes, acostumbra a ocultarse en la vegetación de las orillas, aunque frecuenta pesqueras y posaderos en medio de ríos y embalses.

**Descripción:** garza grande, de cuello muy largo y aspecto "reptilíneo", de color marrón rayado de negro con dorso y alas de color gris violáceo.

**Estatus:** reproductor estival.

**Hábitat:** eneales, carrizales, aguas de corriente lenta con abundante vegetación.

### Garcilla cangrejera

*Ardeola ralloides*



**Descripción:** garza pequeña de pico azulado con punta negra y plumaje ocráceo con plumas de la nuca alargadas y patentes. Cuello largo, aunque a menudo lo mantiene "recogido".

**Estatus:** residente en la zona.

**Hábitat:** aguas de corrientes lentas o estancadas, con abundante vegetación de orla.



**Descripción:** rapaz de tamaño medio, de cuerpo oscuro, cabeza clara y punteada, alas y cola larga terminada en escotadura.

**Estatus:** reproductor estival, con escasos ejemplares invernantes en el vertedero cercano.

**Hábitat:** generalista, frecuenta cultivos, embalses, dehesas, pinares...

### Avefría europea

*Vanellus vanellus*



**Descripción:** la n ibéricas, presenta dos "calzas", hasta cie cuenta con d oscuro. El claro pr res pálidas, blanq pardo o gris y parte El morpho oscuro inferiores de col partes superiores c cuadrangular.

**Estatus:** principa estival, aunque quedarse algunos durante el invierno

**Hábitat:** dehesas, con retazos de veg genes de ríos, pina

**Descripción:** del ta doméstica, partes ras con irisaciones Partes inferiores bl ta una característi plumas finas.

**Estatus:** principa aunque se reprodu en los arrozales ce

**Hábitat:** cultivos, inundables...

- Exportar archivo PDF ▼
- Crear archivo PDF ▼
- Editar PDF
- Comentar
- Combinar archivos
- Organizar páginas ▼
- Censurar
- Proteger
- Optimizar PDF
- Rellenar y firmar
- Enviar para revisar
- Más herramientas

Almacene y comparta archivos en Document Cloud

[Más información](#)



de tamaño medio,  
ejeza clara y puntea-  
terminada en esco-

estival, con esca-  
nantes en el verte-

frecuenta cultivos,  
inares...



**Descripción:** la menor de las águilas ibéricas, presenta los tarsos emplumados "calzas", hasta los dedos. Esta especie cuenta con dos morphos: claro y oscuro. El claro presenta partes inferiores pálidas, blanquecinas con moteado pardo o gris y partes superiores oscuras. El morfo oscuro presenta las partes inferiores de color marrón oscuro y partes superiores oscuras también. Cola cuadrangular.

**Estatus:** principalmente reproductor estival, aunque en la zona suelen quedarse algunos ejemplares aislados durante el invierno.

**Hábitat:** dehesas, campos cultivados con retazos de vegetación original, márgenes de ríos, pinares...



**Descripción:** el mayor de los vencejos ibéricos, de color marrón oscuro con vientre y garganta de color blanco puro. Alas largas y afiladas, y cola corta ahorquillada.

**Estatus:** reproductor estival.

**Hábitat:** cría en grietas o fisuras de edificios o cantiles rocosos, suele preferir la cercanía de masas de agua.

#### Gallineta común

*Gallinula chloropus*



**Descripción:** algo mayor que una paloma, de tonos oscuros, cola corta y blanca, pico rojo con punta amarilla y escudete también rojo. Patas largas, con dedos también largos de color verde intenso.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** aguas quietas con abundante vegetación, tanto flotante como de orla.



**Descripción:** limícola de pequeño tamaño, de pico corto y fino. Presenta anillo ocular amarillo intenso, más patente en época reproductora. Partes superiores marrón claro que contrastan con las inferiores blancas, banda pectoral y antifaz oscura.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** orillas limosas, lagunas pandas, arenas encharcadizos...

#### Martín pescador común

*Alcedo atthis*



**Descripción:** de tamaño similar al gorrión, partes superiores de color azul más intenso en la espalda y obispillo, mientras que las inferiores son de un llamativo naranja, garganta y laterales del cuello blanco níveo. Pico largo y robusto, cola muy corta.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** muy ligado al medio acuático en todas sus vertientes.



**Descripción:** algo menor que un canario, de color verdoso amarillento listado. Pico muy corto, cola ahorquillada. El macho es más amarillento en el periodo reproductor, mientras que la hembra presenta tonos verdosos más discretos.

**Estatus:** residente.

**Hábitat:** generalista, puede observarse en jardines, setos, cultivos, zonas abiertas, dehesas, bosques de coníferas.

#### Andarrios chico













*Actitis hypoleucos*



**Descripción:** limícola de pequeño tamaño, de partes superiores marrón moteado más oscuro, lista ocular y banda pectoral, sin embargo las partes inferiores son blanco limpio. Patas amarillo-verdosas, y patente banda alar en vuelo.

**Estatus:** invernante.

**Hábitat:** orillas limosas de aguas someras, canales de riego, azudes, corrientes lentas o medias...

-  Exportar archivo PDF ▼
-  Crear archivo PDF ▼
-  Editar PDF
-  Comentar
-  Combinar archivos
-  Organizar páginas ▼
-  Censurar
-  Proteger
-  Optimizar PDF
-  Rellenar y firmar
-  Enviar para revisar
-  Más herramientas

Almacene y comparta archivos en Document Cloud

[Más información](#)